

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートリセブ

第2類医薬品

目薬

抗ヒスタミン作用をもつクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。



## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみ改善されない場合(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量 1回1~3滴、1日5~6回点眼する。

●用法・用量に関連する注意(1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(5)点眼用에만使用すること。

効能・効果 結膜充血、目のかゆみ、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分 塩酸テトラヒドロソリン0.05%、硫酸亜鉛水和物0.1%、ビタミンB<sub>12</sub>0.006%、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.01%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.5%、L-アスパラギン酸カルシウム1% 添加物として、ホウ酸、D-メントール、d-カンフル、ベルガモット油、セラニオール、ヒプロメロース、クロロブタノール、ヒアルロン酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。※有効成分のビタミンB<sub>12</sub>(ピンク色)は光にあたると分解して退色する。使用後は必ずキャップを閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)他の人と共用しないこと。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1~2ヶ月を目安に使用すること。(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7)容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1