

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



ROHTO

Lycée blanc

目薬

販売名:ロートリセブラン

第2類医薬品

疲れを癒す!本来の透明感のある、艶やかな瞳へ!

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®

"リセ"したい時、簡単、確実にアイケアできて、
とっても便利です。



"自由な角度で点眼OK!"

ワンタッチ式スクリュエキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、
閉める時も右に1回カチッと回すだけ。
簡単便利です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることの
ないように

成分

ビタミンB₁₂……………0.006% 塩酸テトラヒドロゾリン……………0.04%
L-アスパラギン酸カリウム……………1% ビタミンB₆……………0.05%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…0.5% クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.01%
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ℓ-メントール、d-カンフル、ベルガモット油、ゲラニオール、クロロブタノール、ベンガルコニウム塩化物、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
※有効成分のビタミンB₁₂(ピンク色)は光にあると分解して退色します。
使用後は必ずキャップをしっかりと閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管してください。
- (2)キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)他の人と共用しないでください。
- (6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1～2ヶ月を目安にご使用ください。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8)容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけますか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9：00～18：00(土、日、祝日を除く)