

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。【眼科用薬】

販売名:ロートアイウィッシュVプレミアム 第2類医薬品

目の疲れ、かすみ*、充血、かゆみ

これら全ての眼症状に効く! アイウィッシュのプレミアム処方!

ロートアイウィッシュVプレミアム

現代社会では目を酷使する環境が増えており、単なる疲れ症状だけでなく、かすみ*や充血、かゆみなど、症状が多様化してきているといわれています。「ロートアイウィッシュVプレミアム」は、そんな現代人の疲れ目を徹底的に研究し、目の疲れ、かすみ*、充血、かゆみ、これら全ての眼症状に1本で効果を発揮する気持ちの良いさし心地の目薬です。ピント調節機能改善に効果を示すネオスチグミンメチル硫酸塩と、角膜修復成分であるアラントインを基準*内最大濃度配合。さらに涙液保持成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムなど国内(基準*内)最多の12有効成分を配合し、ロートの技術を集めたアイウィッシュのプレミアム処方です。

*目やにの多いときなど *基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

◆容器特徴

どの角度からでもさしやすい

フリー
アングル
ノズル®



簡単にアイケアできて、とても便利です。

ワンタッチ式
スクリュー
キャップ



開ける時は先に1回カチッと回し、閉める時も
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意 ⚠

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

成 分

有効成分	配合量	はたらき
塩酸テトラヒドロピリン	0.01%	血管を収縮させて目の充血を抑えます。
ネオステグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能を回復して目の疲れを改善します。
イブシロン-アミノカブロン酸	1%	起こってしまった炎症症状を鎮めます。
アラントイン	0.3%	角膜を修復し、炎症症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	炎症の原因となる物質の放出を抑え、かゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンをブロックして目のかゆみを抑えます。
ビタミンB ₆	0.05%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
パントテノール	0.1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
酢酸d-α-トコフェロール	0.025%	血行を促進して目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	細胞呼吸を促進して目の疲れを改善します。
タウリン	1%	目の組織代謝を活発にして、目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1%	角膜表面を保護して目の疲れを改善します。

※添加物としてポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、クロロブタノール、エデト酸Na、ホウ酸、塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、l-メントール、dl-カンフル、セラニオール、ユーカリ油、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、pH調節剤

効能・効果

- 目の疲れ
- 結膜充血
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 目のかゆみ
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問合せ先

製品についてご意見やご要望、お困りことや
お悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
あなたのお声におこたえします。



コミュニケーションコール(お客様相談室)

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)