

朝や日中の、目やにが気になる時などに

ロート新緑水[®]

目やにによるかすみ・炎症を鎮める、スッキリ気持ちいいさし心地です。

日中、気がつかずについている目やに。人から見られると不潔に思われそう…。

朝、起きて目やにで目がかすむと「目が不調?」と不安になる。

目やにが多く出る目は、知らない間に細胞が炎症トラブルを起こしているサインかも。

「ロート新緑水b」は、そんな目やに悩みに着目した処方設計です。炎症をしっかり鎮める、生薬由来のベルベリン塩化物水和物とアズレンスルホン酸ナトリウム水和物のダブルの抗炎症成分を配合。あなたのモヤモヤをすっきりさせ、目のかすみ・眼病予防に効果を発揮します。また、抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。朝や日中の目やにが気になる時に、スッキリ気持ちいい「ロート新緑水b」を。

目やに悩み を考えた 処方設計

生薬由来の抗炎症成分W配合

ベルベリン塩化物水和物
0.012%

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
0.02%



涙液成分の補給

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
0.5%

目のかゆみを抑える

クロルフェニラミンマレイン酸塩
0.03%

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回力チツと回し、閉める時も
右に1回力チツと回すだけ。簡単便利です。

使用方法

目やにが多く、目がかすむ時などに、1回1~3滴を1日に5~6回点眼してください。

※特に、目やにが出たあとだけでなく、睡眠前(就寝より5分以上前を目安)にも点眼することをおすすめします。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
- (3) 次の症状のある人はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

成分

ベルベリン塩化物水和物.....0.012%
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物.....0.02%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム.....0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.03%
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、 ℓ -メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、エデト酸Na、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ソルソールベート80、BHT、pH調節剤を含有します。防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。有効成分のベルベリン塩化物水和物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物は光に当たると分解して退色するので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管してください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※本剤の薄緑色はベルベリン塩化物水和物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物の成分が混ざり合った色です。点眼時、衣服等につかないようご注意ください。万一、衣服についた場合はすぐに洗い流してください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)