

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートデジアイコンタクト

第3類医薬品 目薬 12mL

⚠ 使用上の注意



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障
2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持っ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼する。

●用法・用量に関連する注意 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないこと。(3)点眼用にのみ使用すること。(4)コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。

効能・効果 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分 硫酸亜鉛水和物0.1%、ビタミンB60.1%、タウリン1%、ネオスチグミンメチル硫酸塩0.001%、酢酸d-α-トコフェロール0.01%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.5% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、クエン酸Na、塩化Na、ℓ-メントール、d-カンフル、ヒアルロン酸Na、エドト酸Na、ゴマ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)他の人と共用しないこと。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2～3ヶ月を目安に使用すること。(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7)容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装用したまま目薬を使用する場合は、外箱や、添付文書(箱内側の説明書き)を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できる目薬を使用しましょう。(本品はカラーコンタクトレンズ装用中には使用しないでください。)