

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

# 新 Vロートa

眼科用薬

新Vロートa  
第2類医薬品

ROHTO

目の疲れ・眼病予防に。  
日常起こりがちな、  
様々な目の不快症状に。

長い間働き続けると

目の疲れやかすみ、

充血、かゆみなど、

様々な不快症状が

起こりがちです。

そんな時には、この「新Vロートa」。

7種の有効成分をバランスよく配合した

目全体にゆきわたる気持ちよいさし心地。

いつまでも大切にしたい目に、

「新Vロートa」がしっかりと効きます。



13mL

## 【成分】

● パンテノール

● ビタミンB6

● コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

● L-アスパラギン酸カリウム

● 塩酸テトラヒドロゾリン

● グリチルリチン酸二カリウム

● クロルフェニラミンマレイン酸塩

## 【はたらき】

新陳代謝を促進し

角膜を保護し

瞳の呼吸を活性化し

血管を収縮させ

炎症の原因に作用して

ヒスタミンをブロックし

目の疲れを  
改善します

充血を除去します

目のかゆみを  
抑えます

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意

### 相談すること



#### 1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い |

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

## 効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にはのみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

## 成 分

|                         |       |                      |       |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| パンテノール……………             | 0.1%  | グリチルリチン酸二カリウム……………   | 0.1%  |
| ビタミンB6……………             | 0.05% | クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… | 0.01% |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…………… | 0.1%  | L-アスパラギン酸カリウム……………   | 1%    |
| 塩酸テトラヒドログリシン……………       | 0.01% |                      |       |

添加物として、アミノカプロン酸、*l*-メントール、*d*-カンフル、ユーカリ油、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、*d*-ボルネオール、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、塩化Na、ポリソルベート80、エタノール、pH調節剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



### お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったの意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

**ROHTO** ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1