

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

# ロート アイビジョン

販売名:ロートアイビジョン

第3類医薬品

## 疲れた瞳に 視る力を回復サポート

スマホやタブレットなどのデジタルデバイスを  
長時間使うと、瞳はストレスを受けてしまっています。

「ロートアイビジョン」はそんな悩みに着目。

炎症症状への効き目を考えたBTA処方を採用。

さらに、ピント調節機能改善成分が視る力を回復サポートし、  
疲れ目を癒します。

### 炎症<sup>炎症</sup>への効き目を考えたBTA処方

〈生薬由来〉ベルベリン塩化物水和物  
タウリン

〈生薬由来〉アズレンスルホン酸ナトリウム

### ピント調節 機能改善

ネオスチグミン  
メチル硫酸塩

### 角膜保護 成分

コンドロイチン硫酸  
エステルナトリウム

しみない  
さし心地

防腐剤  
無添加\*

\*防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

いつでも、どこでも、簡単にさせる!

フリー  
アングル  
ノズル<sup>®</sup>



目薬をさすのが苦手なお子さまでも  
簡単にさすことができます。

ワンタッチ式  
スクリュー  
キャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

目薬を上手に  
さしてみよう!  
寝る前などに  
お使いください。

1 まず手を  
洗って清潔に



2 片手で  
あかんべえをする



3 まつ毛やまぶたに  
ふれないように  
目薬をさす




4 約1分間  
目を閉じる



### コラム こどもの目はストレスフル?!

習い事などで忙しい現代のこどもたち。瞳もデジタルデバイスなどで  
ストレスを受けやすい環境。デバイスなどで近くのを長く見続けると、  
目の成長バランスが崩れて仮性近視、さらには近視になると言われ  
ています。デバイスを30分以上使ったら一度目を休める、蒸しタオルで  
目を温める、遠くを見るなどして、瞳がストレスを感じにくいような環境  
をつくりましょう。何か異常がある場合は眼科専門医を受診しましょう。



## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、結膜充血、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回1～2滴、1日3～4回点眼してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

## 成 分

ベルベリン塩化物水和物…0.025%、アズレンスルホン酸ナトリウム…0.02%、タウリン…0.1%、ネオスチグミンメチル硫酸塩…0.005%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…0.25%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、BHT、ユーカリ油、d-ボルネオール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、ゴマ油、pH調節剤を含有します。

防腐剤（ベンザルコニウム塩化物、パラベン）を配合していません。

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。※有効成分のベルベリン塩化物水和物、アズレンスルホン酸ナトリウムは光に当たると分解して退色するので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管してください。(2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になり品質が変わる)(5) 他の人と共用しないでください。(6) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。(7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。(9) 誤用をさけるため、使用済みの空容器は捨ててください。

※本剤の薄緑色はベルベリン塩化物水和物、アズレンスルホン酸ナトリウムの成分が混ざり合った色です。点眼時、衣服等につかないようご注意ください。万一、衣服についた場合はすぐに洗い流してください。

## お問合せ先

製品についてご意見やご要望、お困りごとやお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。あなたのお声におこたえします。



コミュニケーションコール(お客様相談室)

**0120-610-755**

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

**Rohto**

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

402657201