

目薬

目のつかれ・充血 かゆみ・目のかすみ

第3類医薬品

ニューハイアートE

△ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴 点眼して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。
また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用のみ使用して下さい。



容器の先をまぶた、まつ毛に触れないようにしましょう

裏面もお読み下さい

成分・分量 100mL中

成 分	分 量	はたらき
酢酸d-α-トコフェロール	50mg	血行を促進し、目の細胞の老化を防ぎます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目の筋肉に働きかけ、つかれ目や、かすみ目に効果
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目の炎症を鎮め、かゆみ等を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	50mg	目の炎症を抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1,000mg	目の充血、炎症を鎮めます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	目の表面のかわき(ドライアイ)を防ぎます。
タウリン	100mg	目の組織代謝を活発にし、目の疲れを改善します。

添加物としてホウ酸、クロロブタノール、パラベン、l-メントール、d-ボルネオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

※ 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

中新薬業株式会社

電 話 (076) 475-2121

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)

