

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

目薬 目のつかれ・充血・かゆみ・眼病予防

ユニエースクール

第3類医薬品

ユニエースクールは、目の疲れをとり、機能の回復を早めるネオスチグミンメチル硫酸塩、ピリドキシン塩酸塩、タウリンをはじめとし、目の炎症を鎮め、かゆみ等を抑えるイプシロン-アミノカプロン酸、クロルフェニラミンマレイン酸塩及び目の表面の乾燥を防ぐはたらきのあるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合した、スキッとした清涼感のある目薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴 点眼してください。

裏面もお読みください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。



成分・分量 100mL中

成 分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピントを調節する機能に作用し、目の疲れ、目のかすみを改善します。
イブシロンーアミノカプロン酸	1,000mg	抗炎症・抗アレルギー作用により、目の充血をとり、炎症をしずめ、かゆみを抑えて、不快な症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	
ピリドキシン塩酸塩	100mg	目に栄養をあたえ、新陳代謝を促進して、目の疲れを和らげます。
タウリン	1,000mg	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	目の乾燥を防いで、目を保護し、眼病を予防します。

添加物：クロロブタノール、パラベン、エデト酸Na水和物、D-マンニトール、l-メントール、d-ボルネオール、ホウ酸、塩化Na、アルコール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

※自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないでください。（容器が変形することがあります）

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話:0120-584-419

受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

製造販売元 中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉504-2