

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

# アイガングールド

目のつかれと充血に…

V.B<sub>12</sub>(シアノコバラミン) | 配合  
V.B<sub>6</sub>(ピリドキシン塩酸塩)



目薬

パソコン、インターネット、TVゲーム……情報化時代といわれる現代は、また、目を酷使する時代でもあります。

アイガングールドは目の疲れ・かすみなど、気になる症状に効果をあらわします。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。  
    緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)2週間位使用しても症状がよくならない場合

### 【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 【用法・用量】

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。  
(携帯される場合、添付の携帯袋をご利用ください。)

### 【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目にや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- (4)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。



裏面もよくお読みください。

## 【成分・分量】


100mL中

成 分	分 量
シアノコバラミン (V · B <sub>12</sub> )	5mg
ピリドキシン塩酸塩 (V · B <sub>6</sub> )	50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg
L-アスパラギン酸 マグネシウム・カリウム (等量混合物)	500mg

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、パラベン、クロロブタノール、プロピレングリコール、I-メントール、d-ボルネオール、エタノールを含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光や蛍光灯の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。  
(ビタミンB<sub>12</sub>は光が当たると分解して退色します)
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。



## ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)