

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬

第2類医薬品

愛眼EN

愛眼ENは、天然型ビタミンEの配合により、疲れ目の回復を早めるとともに目のかゆみ・目のかすみなどの不快な症状に効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合

- (3)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回2~3滴、1日3~6回点眼してください。

（携帯される場合、添付の携帯袋をご利用ください。）


〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。容器の先が、まぶたやまつ毛に触れますと、目にやにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- (5)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。
- (6)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (7)点眼用にのみ使用してください。



裏面もよくお読みください。

【キャップの開閉方法】



容器の側面をもち、
キャップを上にし
手前にひねってく
ださい。



力チッと音がする
まで押し下げてく
ださい。

容器の中心を押さえて開封すると薬液がとびだすことがあ
ります。

【成分・分量】


100mL中

成 分	分 量
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	21mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg
エフェドリン塩酸塩	20mg
L-アスパラギン酸 マグネシウム・カリウム (等量混合物)	1000mg

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、クロロブタノール、l-メントール、d-ボルネオール、d-カンフル、プロピレンギリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)