

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目のつかれ・かすみに

アイリスネオ<クール>

(目薬)

第3類医薬品

- ◆アイリスネオ<クール>は、日常生活の中で目を酷使して起こる、目のつかれ・かすみに効果的な目薬です。
- ◆「ネオスチグミンメチル硫酸塩」が目のピント調節機能を改善し、目のつかれをやわらげます。
- ◆スキッとしたクールなさし心地です。



使用上の注意



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
 緑内障

- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- ③ 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能

目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感



用法・用量

1日3~6回、1回2~3滴を点眼してください。

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

成 分

成 分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	目のピントを調節する毛様体筋に作用し、目のつかれ・かすみを改善します。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05%	末梢血管の血液の流れを改善し、栄養供給を促進して目のつかれをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	0.1%	弱った目の組織代謝を活性化し、目のつかれをやわらげます。
タウリン	1.0%	細胞代謝を促進し、目に栄養を与え、目のつかれをやわらげます。
L-アスパラギン酸カリウム	1.0%	目の組織呼吸を促進し、目のつかれをやわらげます。

添加物 : l-メントール、リュウノウ、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、クエン酸、クエン酸Na、ホウ酸、pH調節剤、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくは早く使用してください。
(品質保持のため)
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとて使用してください。



目薬をさす時の注意と正しいさし方

注 意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しくさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしづくを落としてください。



発 売 元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元

テイカ製薬株式会社

富山県富山市荒川1丁目3番27号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)