

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

冷たい刺激が持続する

COOL IC

Super, refreshing Aspara COOL IC. Its multi-purpose formula includes seven ingredients which reduce eye fatigue and inflammation.

目の疲れ・充血・目のかゆみに

Aspara

第2類  
医薬品

アスパラ<sup>®</sup>目薬クールIC

7種の有効成分と冷たい刺激でリフレッシュ

アスパラ目薬クールICは、強い清涼感が気持ちよく持続する目薬です。マルチパープル処方の有効成分が疲れ目や充血、かゆみなどの炎症を取り去ります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



## 成分(100mL中)

成分	含量	はたらき
L-アスパラギン酸カリウム	500mg	細胞に栄養を与え、新陳代謝を活発にして疲れ目を改善します。
L-アスパラギン酸マグネシウム	500mg	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウムとともに新陳代謝を活発にして疲れ目を改善します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100mg	L-アスパラギン酸カリウム・マグネシウムとともに新陳代謝を活発にして疲れ目を改善します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント調節機能を改善し、疲れ目の症状を緩和します。
塩酸テトラヒドロゾリン	30mg	目の血管を収縮して充血・目のかゆみの症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用で目のかゆみなどの炎症を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	充血や目のかゆみなどの炎症を鎮めます。


添加物:ホウ酸、ホウ酸Na、エデト酸Na水和物、ポリソルベート80、*l*-メントール、*dl*-カシフル、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール

### 〈成分に関する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

## 保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。  
(品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白く付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



## お願い

ツイストキャップの開封方法：必ずキャップを上にしてあけてください。

- あけ方 キャップを手前にひねります。(容器の中心を押されたまま開封すると薬液がとびだすことがありますので、ご注意ください。)
- しめ方 カチッと音がするまで押し下げます。



製造販売元  
**田辺ファーマ株式会社**  
大阪市中央区道修町3-2-10

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

田辺ファーマ株式会社「くすり相談センター」  
(フリーダイヤル 0120-54-7080)  
受付時間:弊社営業日の9:00~17:30

※本製品は、環境問題に配慮し携帯袋は採用しておりません。