

## 目のかゆみ、結膜充血に 抗ヒスタミン剤・充血除去剤配合

第2類医薬品

# ハイユニー 目薬

近年の環境変化により、花粉やハウスダスト（室内のほこり）、大気汚染などが原因となるアレルギー性の眼疾患が増えています。

「**ハイユニー**」は、アレルギー性の眼疾患にみられる「目のかゆみ」「結膜充血」等の不快な症状に効果のある7つの成分を配合した、さし心地のさわやかな目薬です。

### 特 徴

- **アレルギー症状を原因からおさえます。**  
グリチルリチン酸二カリウムがアレルギー症状をひきおこすヒスタミンの放出を抑制し、症状の発現をおさえます。
- **目のかゆみ、充血を改善し、不快感をやわらげます。**  
抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩がヒスタミンの作用をおさえ、目のかゆみを改善し、塩酸テトラヒドロゾリンが結膜の充血を取り除きます。
- **目の炎症をしずめます。**  
抗炎症剤のグリチルリチン酸二カリウムと抗プラスミン作用のあるイプシロン-アミノカプロン酸の働きにより、炎症をしずめます。
- **傷ついた角膜を保護し、回復を助けます。**  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、タウリン、ピリドキシン塩酸塩は傷ついた角膜を保護し、栄養を与えて回復を助けます。



### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
緑内障



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効 能

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1日3～5回、1回1～3滴を点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。



## 成分・分量 100mL中

塩酸テトラヒドロゾリン	30mg	イプシロン-アミノカプロン酸	1,000mg
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
ピリドキシン塩酸塩	100mg	タウリン	1,000mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg		

添加物としてホウ酸、エデト酸Na水和物、クロロブタノール、パラベン、l-メントール、ホウ砂、d-ボルネオールを含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
  - (4)他の人と共用しないでください。
  - (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- ※自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないでください。(容器が変形することがあります)



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱町40番6号



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県清川市上小泉504-2