

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 結膜炎・ものもらい マリンスカイ抗菌

眼科用薬

15mL

防腐剤無添加

第2類医薬品

- **サルファ剤(スルファメトキサゾールナトリウム)配合**  
結膜炎やものもらいの原因であるブドウ球菌などの細菌に優れた抗菌作用を示します。
- **2つの抗炎症剤(イブシロン-アミノカブロン酸, グリチルリチン酸二カリウム)配合**  
2つの抗炎症剤が細菌等による目のかゆみ, 痛み, はれなどの症状を鎮めます。
- **タウリン配合**  
目に栄養を与え細胞感染により傷ついた目の組織修復に役立ちます。
- **防腐剤(ベンザルコニウム塩化物, パラベン類)無添加**  
薬物アレルギーや角膜上皮細胞に障害を与える危険性があるといわれている防腐剤を含んでいません。



## 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

\*1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人：はげしい目の痛み
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

### <「ものもらい」についての注意>

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので、過労をさけ、睡眠を十分とるよう心がけてください。

## 【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
容器の先がまぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にはのみ使用してください。

## 【成分・分量】100mL中

成分	分量	はたらき
スルファメトキサゾールナトリウム	4000mg	いろいろな細菌にすぐれた抗菌作用を示し、また長時間作用が持続します。
グリチルリチン酸二カルウム	200mg	かゆみ、痛み、はれなどの炎症症状をしずめ、またスルファメトキサゾールの抗菌力を増強することが認められています。
イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	細菌等の感染によるはれ、ただれなどの炎症の原因になる物質を抑えます。
タウリン	200mg	目に栄養を与え細菌感染により傷ついた目の組織の修復に役立ちます。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、チオ硫酸Na水和物、エドト酸Na水和物を含有します。

### <成分・分量に関連する注意>

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じる場合があります。これは成分であるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カルウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。  
製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。高温下に放置した製品は、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってから使用してください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記までお願い申し上げます。

お問い合わせ先： 佐賀製薬株式会社 電話： 0942-92-5656  
受付時間： 午前9:00～午後5:00(土曜、日曜、祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481