

抗菌アイリス使いきり  
第2類医薬品

開封口

▼清涼感レベル  
なし 1 2 3 4 5

使用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
皮膚・発疹・発赤、かゆみ/目：充血、かゆみ、はれ、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。  
●ショック(アナフィラキシー)：使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 3. 3~4日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 他の人と共用しないでください。(5) 本剤は光による薬液の変質を防ぐため、着色容器・着色袋を使用しておりますが、保存する場合は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。(6) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)(7) スポンの後ろポケット等に製品を入れたら、キャップがあくことがありますので、注意してください。(8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

大正製薬株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
https://brand.taisho.co.jp/iris/

お客様  
119番室

03-3985-1800  
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

保存する場合は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。

用法・用量

1日3~6回、1回2~3滴を点眼してください。

【使い方】

- ・無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。
- ・1本で両眼に点眼できます。



【注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また湿潤したものは使用しないでください。
4. ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
5. 点眼用のみ使用してください。
6. いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
7. 本剤は「回使いせりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんが、使用後の残液は捨ててください。

※本剤は、滯留性のある製剤であるため、点眼後しばらく視野がぼやけることがありますので注意してください。

副作用救済制度

0120-149-931



大正製薬

ものもらい・結膜炎に

抗菌アイリス  
使いきり

製品情報は  
こちら▼



0.4mL×18本入

第2類医薬品



効能

ものもらい、  
結膜炎(はやり目)、  
眼瞼炎(まぶたのただれ)、  
目のかゆみ

成分

スルファムキザゾール…4.0%  
グリチルリチン酸二カルウム…0.25%  
イプシロン-アミノカプロン酸…1.0%  
ピリドキシン塩酸塩…0.1%  
(ビタミンB6)

添加物：ジェランガム、トロメタモール、クエン酸Na、エドト酸Na

【注意】

本剤の点眼後、口中に苦みまたは甘みを感じることがありますが、苦みは有効成分のスルファムキザゾールによるもの、甘みは有効成分のグリチルリチン酸二カルウムによるものだから、心配ありません。

製造番号

使用期限(西暦年月)

ものもらい  
・結膜炎に

小さなお子さまにも

抗菌アイリス  
使いきり



大正製薬

眼科用薬

(実物大)



抑える  
抗菌成分  
サルファ剤

鎮める  
2種類\*の  
抗炎症成分

留まる  
独自の  
製剤技術

第2類医薬品 18本入

\*グリチルリチン酸二カルウム、  
イプシロン-アミノカプロン酸



倍率見本 1.00倍

エコパッケージ：添付文書をなくし、  
紙の使用量を削減(従来品比)

31

