

抗菌性点眼薬

結膜炎・ものもらいに アニッシュ 抗菌

サルファ剤・抗ヒスタミン剤・抗炎症剤配合

ANISH ANTIBACTERIAL EYE DROPS

結膜炎（はやり目）、ものもらい（麦粒腫）、眼瞼炎（まぶたのただれ）などの目の病気は、ブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌の感染によっておこります。アニッシュ 抗菌は、これら眼病の原因になる細菌に有効なサルファ剤をはじめ4種の有効成分を配合した点眼薬です。

① 抗菌作用

サルファ剤のスルファメトキサゾールナトリウムは、細菌にすぐれた抗菌作用を示します。

② 抗ヒスタミン作用

クロルフェニラミンマレイン酸塩は、目のかゆみをしずめます。

③ 消炎作用

2つの抗炎症剤グリチルリチン酸二カリウムとイブシロン-アミノカブロン酸は、感染時におこるかゆみなどの炎症症状をしずめます。



使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用에만使用してください。

成分・分量(1mL中)

成 分	分 量
スルファメトキサゾールナトリウム	40mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg
グリチルリチン酸二カリウム	2.5mg
イプシロン-アミノカプロン酸	10mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na

〈成分・分量に関連する注意〉

点眼後、ときに口中に、苦味又は甘味を感じることがありますが、これは主成分が涙道を通して口中に流れ出てくるためで、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。
- (6) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



 発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 テイカ製薬株式会社 富山市 荒川一丁目3番27号