

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ものもらい・結膜炎に

目薬

抗菌パシエ

第2類医薬品

0.3mL×20本入


ものもらい

結膜炎
(はやり目)

眼瞼炎
(まぶたのただれ)

1回使いきり
タイプ

使いたいとき、いつも衛生的な
1回使いきりタイプです。



- サルファ剤配合
結膜炎やものもらいの原因であるブドウ球菌などの細菌に優れた抗菌作用を示します。
- 2つの抗炎症剤配合
2つの抗炎症剤が細菌等による目のかゆみ、痛み、はれなどの症状を鎮めます。
- タウリン配合
目に栄養を与え細胞感染により傷ついた目の組織修復に役立ちます。
- 防腐剤フリー
防腐剤が入っていないので、炎症を起こした目でもしめないソフトなさし心地です。お子様にもご使用いただけます。



使用上の注意

必ず読むこと!



⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) はげしい目の痛みのある人
 - ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |
- ③ 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

【ものもらい】についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので、過労をさけ、睡眠を十分とるよう心がけてください)

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください

用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用에만使用してください。
- (6)本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤です。防腐剤を含有しておりませんので、一度、開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。

容器の先が



まぶた、まつ毛に
ふれないように

【使用方法】

- ①キャップ部分を無理にひっぱらずに、ゆっくり回して開けてください。
※いきおいよく開封したり、強く押さえて開封すると薬液が飛び散ることがありますのでゆっくり開封してください。
- ②容器の先がまぶた、まつ毛に触れないように点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)
- ③点眼後、一度開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。

成分・分量

スルファメトキサゾールナトリウム	4.0%	イブシロン-アミノカブロン酸	1.0%
グリチルリチン酸二カリウム	0.2%	タウリン	0.2%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、チオ硫酸Na水和物、エドト酸Na水和物を含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じることがあります。これは成分であるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本剤は光による薬液の変質を防ぐため、着色容器・着色袋を使用しておりますが、保存する場合は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。
- (6)自動車内や暖房器具の近く等高温下に放置しないでください。
- (7)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップが開くことがありますのでご注意ください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願い申し上げます。

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-415-688

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

製造販売元

ファーマパック株式会社
富山県富山市小中163番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_index/html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)