

## 目薬

# コンタクトレンズ装着時の不快感・ 目の疲れ・目のかわき

第3類医薬品

# アイミンCL<sup>®</sup>

- 涙液成分によって目のかわきをうるおします。
- コンタクトレンズを装着している時の不快感を取り除きます。
- コンタクトレンズ(ソフト・O<sub>2</sub>・ハード・使いすて)を装着したまま点眼できます。
- コンタクトレンズを装着されていない方もご使用いただけます。
- 目の疲れ、目のかすみ<sup>\*</sup>にも効果があり、やさしいさし心地の目薬です。

<sup>\*</sup>目やにの多いときなどによる



## ⚠ 使用上の注意



### ■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人  
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 目のかすみが改善されない場合
  - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

### <用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用のみ使用してください。



## 成分・分量(100mL中)

成分	分量	はたらき
L-アスパラギン酸 カリウム	100mg	目の新陳代謝を活発にし、目の疲れをやわらげます。
タウリン	100mg	目に栄養をあたえ、目の疲れをやわらげます。
塩化カリウム	150mg	涙の構成成分で、涙液不足をおぎない、目のかわきをいやします。
塩化ナトリウム	550mg	

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エドト酸Na、ポリソルベート80、クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないでください。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)の過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748) 88-3180(大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



**滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879