

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

人工涙液 ～うるおい感が持続 とろっと・やさしいさし心地～

ファースト
1STマイティアCL-P

第3類医薬品

販売名 ファーストマイティアCL-P


特 徴

【つらいドライアイに】

保水性高分子(ヒプロメロース)配合により、とろとした粘性のある液が角膜の表面を柔らかく覆い、うるおい感が持続します。コンタクトレンズによるつらいドライアイ(目のかわき)や、目の疲れによく効きます。

- すべてのコンタクトレンズ(ソフト・ハード・O₂・使い捨て)を装着したまま使用いただけます。
- コンタクトレンズを装着されていない方も使用いただけます。
- とろとやさしいさし心地。
- 粘性がある無色透明の目薬です。

キャップの開閉方法



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. この場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) ハードコンタクトレンズ装着の人で、目やになどの分泌物が多く、レンズがくもった場合
 - (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

その他の注意

薬液に粘性をもたせているため、点眼後しばらく視野がぼやけることがあるので注意すること。

効能

ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回1～2滴を1日5～6回点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (2)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと
(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)点眼用にのみ使用すること。
- (4)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛に
ふれないように


成 分 1mL中

成 分	含 量
ヒプロメロース	5mg
塩化ナトリウム	1mg
塩化カリウム	1.5mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



容 量 9mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」

〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)