

ご使用に際して、この説明文書を
必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう
大切に保存してください。

スマイルコンタクトモイスト クールMAX

目薬

第3類医薬品

スマイル[®]コンタクト moist



コンタクトを
これからも快適に。

負担のかかる瞳のことを考えた設計

涙に近い
成分配合

塩化ナトリウム

うるおいを
とどめ
角膜を保護

コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

栄養補給^{※1}
酸素補給^{※2}

※1 タウリン ※2 L-ア
スパギン酸カリウム

清涼感
レベル

マイルド

クール

クールMAX

なし

1

2

3

4

5

6

7

弱

強

裸眼時とすべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。

裸眼

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

防腐剤
無添加

スマイルの独自技術により防腐効果を持たせて
います。防腐剤（ベンザルコニウム塩化物など）を
配合していません。
使用期限や保管方法も防腐剤配合の目薬と同様
にお使いいただけます。

ツイストキャップの開閉方法 → 必ずキャップを真上に向けて開閉してください。

① 開け方

容器の側面をもち
キャップをひねる



② 閉め方

音がするまで
キャップを
まっすぐ押す



容器の広い部分をもって開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

必ず裏面もお読みください

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなるしない場合。

● 効能

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.25g
タウリン(アミノ酸類)	0.2g
L-アスパラギン酸カリウム(アミノ酸類)	0.1g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.2g
ポビドン(うるおい成分)	0.25g

添加物として、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、*l*-メントール、*d*-カンフルを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

◇自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

■お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 **0120-813-752**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28