

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。＜目薬＞

第3類医薬品



# ロトCキューブプラス モイスト

とろみ<sup>®</sup>の一滴  
ドライアイ(目の乾き)改善

## 特 長

- ◆ すべてのコンタクトレンズを装着したまま使用できます。  
また、コンタクトレンズをはずした後にもご使用いただけます。

ソフト   ハード   O<sub>2</sub>   使い捨て

- ◆ ミネラル成分配合で乾いた瞳にうるおいを補給します。
- ◆ 瞳にうるおいをとどめるヒプロメロース配合で、目の乾きや疲れに効果的です。
- ◆ レンズにうるおいベール<sup>®</sup>を作るポロクサマー(溶解補助剤)配合
- ◆ ヒアルロン酸Na(製剤の粘稠剤)配合

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル<sup>®</sup>

簡単にアイケアできて、とっても便利です。



## キャップの開閉方法

容器のわきもち、キャップ部分を上にして、開閉してください。  
※容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしていただけることがあります。

### キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



### キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



## △ 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

1回1～2滴、1日5～6回点眼してください。

### — 用法・用量に関連する注意 —

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



## 効能・効果

涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 成 分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%
塩化カリウム(ミネラル成分)	0.08%
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.44%
塩化カルシウム水和物(ミネラル成分)	0.005%
ヒプロメロース	0.35%
ブドウ糖	0.09%

添加物: ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(ポロキサマー)、エドト酸Na、pH調節剤、塩酸ポリヘキサニド

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※潤いをとどめるため、薬液に粘性をもたせております。そのため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。

### お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1