

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートリセコンタクトw 第3類医薬品 目薬+装着液

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障  
2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみが改善されない場合(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

**用法・用量** ●点眼の場合:1回1~3滴、1日5~6回点眼する。●コンタクトレンズ装着の場合:コンタクトレンズの両面を1回1~2滴でぬらした後装着する。

**用法・用量に関連する注意**(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛、コンタクトレンズ、指に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(3)点眼薬、コンタクトレンズ装着液としてのみ使用すること。(4)コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。

**効能・効果** ●点眼の場合:目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)●コンタクトレンズ装着の場合:ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

**成分** 塩化カリウム0.08%、炭酸水素ナトリウム0.05%、塩化ナトリウム0.44%、ヒプロメロース0.02%、ブドウ糖0.02%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.5% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、ヒアルロン酸Na、塩酸ポリヘキサニド、ℓ-メントール、ゲラニオール、pH調節剤を含有する。

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)他の人と共用しないこと。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7)容器に他の物を入れて使用しないこと。  
[コンタクトレンズ使用の際の注意]\*コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にすること。\*コンタクトレンズを清潔に、また清浄に保つために、洗浄、消毒、保存など毎日のレンズケアについては十分心がけること。\*コンタクトレンズ使用中の方は、眼科医による定期検査を必ず受けること。

お問い合わせ先  
お客さま安心  
サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230  
受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1