

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートCキューブ®クールa 第3類医薬品

13mL 目薬

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

#### 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師

#### 又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

#### 3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼する。

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) 点眼用にのみ使用すること。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。

## 効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 成分

塩化カリウム0.03%、塩化ナトリウム0.49%、塩化カルシウム水和物0.01%、タウリン0.2% 添加物として、ポビドン、ヒプロメロース、ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ℓ-メントール、塩化亜鉛、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないこと。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1