



2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

**第3類  
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



### 目薬

コンタクトをつけたまま点眼

# ノールワン ティア-α

目にアイソトニック

- 非含水性ソフト、ソフト、使い捨て（ディスプレイザブル）、O<sub>2</sub>、ハードコンタクトレンズをつけたまま点眼できます。
- 目のかわき・疲れにすぐれた効果をあらわす、1回使いきりタイプの目薬です。防腐剤を含んでいないので、目にやさしいさしごこちです。
- 眼組織の新陳代謝を整えて目の疲れに効果をあらわす、L-アスパラギン酸カリウムを配合しています。



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

### 〔効 能〕

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）



## 〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼します。

### ご使用法



①容器の先端を無理にひっぱらず、ゆっくり回して開けてください。



②2～3滴捨てたあと、1回1～3滴を点眼してください。(1本で両目に点眼できます。)



③点眼のときは目から離してください。

●容器には多めに薬液が入っています。一度開封したものは薬液が残っていても必ず捨ててください。

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 開封の際に、いきおいよく開封したり、強く押さえて開封すると薬液が飛び散ることがありますので、ゆっくり開封してください。
- (3) 使用の際には、最初の2～3滴は点眼せずに捨ててください。
- (4) 容器を開封するとき、切り方によっては切り口に凹凸が生じる場合がありますので、容器の先端が目につれないように注意してください。
- (5) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (6) 本剤は防腐剤を含まない1回使いきりタイプの目薬ですので、使用後の残液は捨ててください。
- (7) 点眼用にのみ使用してください。

### 〔成分・分量と働き〕100mL中(1本0.5mL)

成分	分量	働き
塩化ナトリウム	790mg	目の機能を正常に保つのに必要な涙液を補助します。
塩化カリウム	70mg	
L-アスパラギン酸カリウム	250mg	眼組織の新陳代謝を整え、目の疲れに効果をあらわします。

添加物として、pH調整剤を含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (6) スポンの後ろポケット等に携帯すると、容器が開封されてしまうことがありますので、ご注意ください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号