

P

眼科用剤

第3類医薬品

第3類医薬品

日本薬局方

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

3g×18包

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

外用剤なので飲まないでください

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

結膜囊の洗浄・消毒に



箱



分包：PE,セロハン



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

001

1205

P

第3類医薬品

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

3g×18包

4



2405

CD-4

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

眼科用剤

第3類医薬品

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

3g×18包

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

〔効能効果〕 結膜囊の洗浄・消毒

〔用法用量〕

2%以下の濃度で用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。(3) 混濁したものは使用しないでください。(4) 眼科用にのみ使用してください。(5) 完全に溶解させてから使用してください。

〔成分分量〕

1包中 日局ホウ酸 3g含有。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 溶かした後は速やかに使用してください。


〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

〔希釈方法〕

2%液：本品1包(3g)をとり、水約150 mLに溶かしてください。

使用期限

製造番号



matsu
kiyo

Boric Acid

日本薬局方

ホウ酸

眼科用剤

・結膜囊の洗浄、消毒に

外用剤なので飲ま
ないでください

第3類医薬品

Boric Acid

For cleaning and disinfecting the conjunctival sac.

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

眼科用剤

日本薬局方

第3類医薬品

ホウ酸

結膜囊の洗浄・消毒に

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないで
ください

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起
こしたことがある人。

(3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場
合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この外箱を
持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【効能効果】 結膜囊の洗浄・消毒

【用法用量】

2%以下の濃度で用いてください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させてく
ださい。(2) コンタクトレンズを装着し
たまま使用しないでください。(3) 混
濁したものは使用しないでください。
(4) 眼科用にのみ使用してください。
(5) 完全に溶解させてから使用してく
ださい。

【成分分量】

1 包中 日局ホウ酸 3g 含有。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少な
い涼しい所に保管してください。(2)
小児の手の届かない所に保管してく
ださい。(3) 他の容器に入れ替えない
でください。(誤用の原因になったり品
質が変わることがあります。)(4) 使
用期限を過ぎた製品は使用しない
でください。(5) 溶かした後は速やかに
使用してください。

〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

【希釈方法】

2%液：本品1包(3g)をとり、水
約150mLに溶かしてください。

製造販売元：健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822

受付時間 9:00~17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など
特別休業日を除く)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。