

結膜囊の洗浄・消毒に

500g

Boric Acid

ホウ酸

日本薬局方

眼科用剤

結晶

第3類医薬品

P

第3類医薬品

結晶

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

500g

外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

第3類医薬品

結晶

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

500g

【効能効果】 結膜囊の洗浄・消毒

【用法用量】 2%以下の濃度で用いてください。

＜用法用量に関連する注意＞

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(3) 眼科用剤にのみ使用してください。

(4) 完全に溶解させてから使用してください。

(5) 混濁したものは使用しないでください。

【成分分量】 1g中 日局ホウ酸 1g含有。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 溶かした後は速やかに使用してください。

＜貯法＞ 密閉容器。室温保存。

【希釈方法】

2%液：添付のスプーン1杯(約1g)を水約50mLに溶かしてください。

※添付のスプーン1杯は約1gです。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号 P1101

使用期限 2015.5

紙箱



スプーン : PE
スプーン袋 : PS
スプーン袋 : PE

P

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

500g

外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

第3類医薬品

結晶

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

結晶

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

500g

△ 使用上の注意

してはいいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ



4 987286 312675