使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人:はげしい目の痛み (4)眼球乾燥症候群(ドライアイ※※)の診断を受けた人※※医師から病名として診断を受ける程度の人を前提としています
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

目の洗浄、眼病予防
(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼してください

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること 2. コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。また再装着する場合は、洗眼してから10～15分程度あけること 3. 洗眼カップは使用前後に水道水で充分に洗浄すること。カップに残った水分は自然乾燥をおすすめします 4. 混濁したものは使用しないこと 5. 洗眼用にのみ使用すること

副作用被害救済制度　☎0120-149-931

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
イプシロン-アミノカプロン酸	200mg	抗炎症作用
アラントイン	30mg	角膜修復作用
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	抗炎症作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB_6)	10mg	代謝促進作用
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	5mg	血行促進作用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg	角膜保護作用

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、エデト酸Na、l-メントール、d-ボルネオール、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

(1)**直射日光の当たらない**涼しい所にキャップをしっかりしめて**箱に入れて**保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)洗眼カップは他の人と共用しないこと

注意事項

●片方の目を洗った液で反対側の目を洗わないでください
●30秒以上洗眼しないでください●コンタクトレンズを装着されている場合は、使用前に必ずコンタクトレンズをはずすこと●使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいにふきとること●保存状態によって容器の口周辺に白い結晶が付着することがあるので、その場合は清潔なガーゼ等で軽くふきとること●コンタクトレンズを使っていない人も使用できます

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※防腐剤とはベンザルコニウム塩化物、パラベン等のことを指します

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北4丁目6番16号


まるごと洗って、瞳をスッキリ清潔・健康に

コンタクトを外した後に **アイボンd 洗眼薬**

コンタクトレンズを使用していると、目の異物感、かゆみ等不快な症状がおこりがちです。目についたタンパク汚れやほこりを洗い流して、スッキリとさせます

販売名:アイボンd　第3類医薬品　Eyewash 洗眼薬

上向きカップで瞳をまるごと洗う



上向き洗眼

- ☑ 瞳をまるごと薬液で包みこむ
- ☑ 汚れ・ゴミをすみずみまで洗い流せる

ぴったりフィットカップ

- ☑ 上向きでも液もれしにくい
- ☑ 目のまわりが痛くなりにくい
- ☑ あとが残りにくい

使い方



薬液を洗眼カップの内側の線(5mL)まで入れる



カップを目にぴったり押し当てる



液がこぼれないよう、カップを目に押し当てたまま、頭を後ろにそらして上を向く



数回まばたきをして洗眼する
●使用後のカップは充分に洗って乾燥させる

10231621