

第3類医薬品

日本薬局方
ホウ酸

「タイセイ」P

3g×16

日本標準商品分類番号
872613

第3類医薬品

日本薬局方 **ホウ酸** 「タイセイ」P

第3類医薬品

外用剤なので
飲まないこと

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

「タイセイ」P

3g×16



製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
0942-53-4662(代表)

Boric Acid

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店、あるいは下記に
お問い合わせください。
大成薬品工業株式会社 D1室
電話：0942-53-4662(代表)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



製造番号
使用期限



ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 2. 長期連用しないこと

👨‍⚕️ 相談すること

次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 発疹、眼瞼(がんげん)炎等の過敏症状があらわれた場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】 結膜囊(けつまくのう)の洗浄・消毒

【用法用量】 2%以下の濃度で用いる。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (2) 眼科用のみを使用すること。

【成分分量】 本品1g 中日本薬局方ホウ酸1g含有

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限内に使用すること。

【希釈方法】 2%：本品1包(3g)をとり、水約150mLに溶かす。

【包装】 3g×16

第3類医薬品

日本薬局方
ホウ酸

「タイセイ」P

3g×16

日本標準商品分類番号
872613

第3類医薬品

日本薬局方 **ホウ酸** 「タイセイ」P

第3類医薬品

外用剤なので
飲まないこと

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

「タイセイ」P

3g×16




製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
0942-53-4662(代表)

Boric Acid

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店、あるいは下記に
お問い合わせください。
大成薬品工業株式会社 D1室
電話：0942-53-4662(代表)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



製造番号
使用期限

紙
外箱、内袋

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 2. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 発疹、眼瞼(がんげん)炎等の過敏症状があらわれた場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】 結膜囊(けつまくのう)の洗浄・消毒

【用法用量】 2%以下の濃度で用いる。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (2) 眼科用のみを使用すること。

【成分分量】 本品1g 中日本薬局方ホウ酸1g含有

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しいところに保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限内に使用すること。

【希釈方法】 2%：本品1包(3g)をとり、水約150mLに溶かす。

【包装】 3g×16