

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



花粉・ハウスダスト等による目のアレルギー症状の緩和に

ビュークリア[®]ALクール

眼科用薬

[特徴]

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性の目のかゆみや充血は、つらく誰しも憂うつになってしまふものです。


ビューカリアALクールは、このようなアレルギー性の目の症状を改善する目薬として開発されました。抗アレルギー成分であるクロモグリック酸ナトリウムと、抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩のダブルアクションで、このような不快な症状を緩和します。

本剤に配合されているクロモグリック酸ナトリウムは、アレルギー症状が起こらないように抑え、クロルフェニラミンマレイン酸塩は、起こってしまったアレルギー症状を緩和します。

さわやかな清涼感とやさしい差し心地がアレルギーによる目の不快感を鎮めます。

花粉やハウスダスト等による目のアレルギー症状に使用する目薬です。

症状がアレルギーによるものかどうかわからないときは医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと事故が起こりやすくなります)

- 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

　　はげしい目の痛み

- (6)次の診断を受けた人。

　　緑内障

- (7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

特に次のような場合は、アレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。

- ・片方の目だけに症状がある場合
- ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- ・視力にも影響がある場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2日間使用しても症状がよくならない場合。

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

[用法・用量]

1回1～2滴、1日4～6回点眼してください。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。

[成 分]

成 分	分 量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1.00%	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.015%	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。

添加物：イブシロン-アミノカプロン酸、ホウ酸、バラオキシ安息香酸メチル、バラオキシ安息香酸プロピル、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール、d-ポルネオール、d-カンフル

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ピュクリアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元
佐賀製薬株式会社
佐賀県三養基郡基山町小倉481