



QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。
URL : <https://minacolor.com/>

アイカフーンAGの特徴

- アイカフーンAGは、〈抗アレルギー成分〉クロモグリク酸ナトリウム、〈抗ヒスタミン成分〉クロルフェニラミンマレイン酸塩、〈抗炎症成分〉グリチルリチン酸二カリウムに加え、〈角膜保護成分〉〈疲労回復成分〉の6つの有効成分を配合した、花粉・ハウスダストなどによる目のアレルギー症状によく効く眼科用薬です。
- さわやかなさし心地のクールタイプです。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〉

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい (眠気等があらわれることがあります。)

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。：はげしい目の痛み
- (6) 次の診断を受けた人。：緑内障
- (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。
 - 片方の目だけに症状がある場合
 - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - 視力にも影響がある場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2日間位使用しても症状がよくなる場合。

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

■ 用法・用量

1回1～2滴、1日4～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用에만使用してください。
- (5) 用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

100mL中に次の成分を含んでいます。

クロモグリク酸ナトリウム	1000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg
グリチルリチン酸二カリウム	125mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	200mg
ピリドキシン塩酸塩	100mg
タウリン	1000mg

添加物としてホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、エタノール、dl-カンフル、d-ボルネオール、L-メントールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

おねがい

品質を保持するため高温になる所に置かないでください。自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。

製品についてのお問い合わせ先

ミナカラ薬局 お客様相談窓口
受付時間: 10:00-16:00(平日・月・金)

☎ 03-5544-8440

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

販売元: ミナカラ薬局 (+ minacolor inc.)

<https://minacolor.com/>

製造販売元:  テイカ製薬株式会社

富山市荒川一丁目3番27号