

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

販売名:ロートアルガードクリアマイルドZ_{II}

ロート アルガードクリアマイルドZ_{II}

【アレルギー症状が続き、かつ炎症を伴う方におすすめします】

第2類医薬品

*既承認一般用眼科用薬中
(平成28年7月現在)

製品の特徴

花粉などのつらい目のかゆみ・充血に効く!

全
有効成分
最大濃度
配合*

抗炎症成分ダブル配合

ブロノプロフェン
グリチルリチン酸二カリウム

抗アレルギー成分 クロモグリク酸ナトリウム

抗ヒスタミン成分 クロルフェニラミンマレイン酸塩

角膜保護成分 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

従来の一般用アレルギー用点眼剤を2日間位使用し、十分な効果が得られなかった方におすすめします。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意!

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は使用しないでください。

(1)7才未満の小児 (2)妊娠または妊娠していると思われる人 (3)授乳中の

2 点鼻薬と併用する場合には、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがある)



相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。

(4)次の症状のある人: はげしい目の痛み (5)次の診断を受けた人: 緑内障

(6)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはつきりしない人。

とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。

●片方の目だけに症状がある場合 ●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合

●視力にも影響がある場合

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ(目のまわりを含む)、刺激感、異物感、なみだ目、目やに、痛み
その他	息苦しさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様 症状	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 3** 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- (1) 症状が悪化した場合 (2) 目のかすみが改善されない場合(緑内障などの可能性も考えられる) (3) 2日間使用しても症状がよくならない場合
- 4** 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1~2滴、1日4回点眼してください。

●用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる)また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
(一旦レンズを外してから点眼してください。)
- (4) 点眼用にのみ使用してください。(5) 用法・用量を厳守してください。



成分・分量

有効成分	配合量	添加物として、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、BHT、ポリソルベート80、ユーカリ油、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤を含有する。
クロモグリク酸ナトリウム	1%	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	
ブランプロフェン	0.05%	
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとてご使用ください。(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401764601