

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

眼科薬

なみだ目・異物感に

マイティア アイテクト[®]

第2類医薬品

販売名 マイティアアイテクト

特 徴

- マイティアアイテクトは、抗炎症成分「プラノプロフェン」〔スイッチOTC成分〕を配合し、目の炎症から起こる「なみだ目、異物感（コロコロ・チクチクする感じ）、目のかゆみ、結膜充血」などの症状によく効きます。

----- プラノプロフェンの働き -----
目に外的刺激※が加わると、炎症の原因物質「プロスタグランジン」が生成されます。「プラノプロフェン」は、炎症の原因となるこの物質の生成を抑制することにより、目の炎症症状に効果を発揮します。

※目の炎症を引き起こす外的刺激には、紫外線、ハウスダスト、コンタクトレンズ、花粉、大気汚染などがあります。

- 目やにの多いときの目のかすみに効きめがあります。
- やさしい清涼感のある目薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

- (1) 7歳未満の小児。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

(4) 次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに
その他	息苦しさ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 症状が悪化した場合。
- (2) 目のかすみが改善されない場合（緑内障等の可能性も考えられる。）。
- (3) 3日位使用しても症状がよくなる場合。
- (4) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合。

効 能

目の次の症状の緩和：


目のかゆみ、異物感（コロコロ・チクチクする感じ）、結膜充血、なみだ目、目やにの多いときの目のかすみ

用法・用量

1回1～2滴、1日4回点眼する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと（目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある。）。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと（一旦レンズをはずしてから点眼すること。）。
- (4) 点眼用にのみ使用すること。
- (5) 用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛にふれないように

成 分 1mL中

プラノプロフェン……………0.5mg

添加物：ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ベンザルコニウム塩化物、ℓ-メントール、ポリソルベート80、ホウ砂、dℓ-カンフル

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2) 本剤は光による品質の変化を防ぐため、使用を開始するまではこの箱などに入れてしゃ光保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (5) 容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (6) 他の人と共用しないこと。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (8) 保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



容 量 15mL

本品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」 〒541-0048 大阪府中央区瓦町三丁目1番9号
電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日を除く）