

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートクリア

第2類医薬品 目薬

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は、使用しないこと。

(1)7才未満の小児 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ、刺激感、異物感、なみだ目、目やに、しみて痛い |
| その他 | 息苦しさ |

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)症状が悪化した場合(2)目のかすみが改善されない場合(緑内障等の可能性も考えられる)(3)3日位使用しても症状がよくなる場合
4. 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量 1回1~2滴、1日4回点眼する。

●**用法・用量に関連する注意** (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(4)点眼用にのみ使用すること。(5)用法・用量を厳守すること。

効能・効果 目の次の症状の緩和:なみだ目、目やにの多い時の目のかすみ、異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、目のかゆみ、結膜充血

成分 プラノプロフェン0.05% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、BHT、ベンザルコニウム塩化物、l-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2)キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めること。(3)小児の手の届かない所に保管すること。(4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(5)他の人と共用しないこと。(6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(8)容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1