

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉、ハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎、急性鼻炎に

新「ザック」鼻炎

第2類医薬品

■特長

- クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗ヒスタミン作用と、グリチルリチン酸の抗アレルギー作用・抗炎症作用により、花粉やハウスダストなどが原因になって起こるアレルギー性鼻炎にすぐれた効果を発揮します。
- 有効成分が持続的に効果を発揮する徐放性製剤ですので、朝と夕1日2回の服用で、鼻炎による不快な症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど)を長時間安定的に改善します。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は、服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 次の症状がある人。
前立腺肥大による排尿困難
 - (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)
3. 服用後は、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる婦人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状がある人。——— 高熱、排尿困難、むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。——— 緑内障、腎臓病
 - (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリンなど)で治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛などがあらわれる。

- (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

口のかわき、便秘

■効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

■用法・用量

次の量を、服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回(朝・夕)
15歳未満の小児	服用しないでください	

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



■成分・分量


2カプセル(1日量)中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を改善します。
グリチルリチン酸	45mg	鼻粘膜の炎症をしずめ、アレルギー症状をおさえます。
塩酸ブソイドエフェドリン	70mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	粘液の分泌をおさえ、鼻水やなみだ目を改善します。
無 水 カ フ ェ イ ン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、カプセル本体に赤色102号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含む。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 変質の原因になりますので、服用しないカプセルは、裏のアルミ箔を傷つけないようにしてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



■包 装 (PTP包装)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。
新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室
TEL 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931