

第②類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



鼻炎用内服薬
JPS鼻炎錠

JPS鼻炎錠は鼻粘膜の充血をおさえるブソイドエフェドリン塩酸塩、鼻水・くしゃみなどのアレルギー症状をおさえるd-クロルフェニラミンマレイン酸塩、鼻粘液の分泌を調整するペラドンナ総アルカロイドを配合しました。さらに生薬成分として鼻づまり、鼻水、鼻アレルギーなどに効果のあるサイシンエキスを配合し、不快な鼻づまりや鼻水などのアレルギー性鼻炎や急性鼻炎の症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

(裏面につづく)

無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなプツプツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

次の量を水又は白湯にて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【成分・分量】

成 分	含量(9錠中)	作 用
α-キロールフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	鼻水・くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
ブソドエフェドリン塩酸塩	18.0 mg	鼻粘膜の充血をおさえ、鼻づまりを改善します。
ペラドンナ総アルカロイド	0.6 mg	鼻水等の分泌を減少させます。
グリチルリチン酸二カルウム	4.0 mg	鼻粘膜の炎症やアレルギーをおさえます。
無水カフェイン	15.0 mg	頭重をおさえます。
サイシン乾燥エキス	100 mg (原生薬換算量 1000mg)	抗アレルギー作用、抗炎症作用があります。

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、CMC-Ca、デキストリン、トウモロコシデンプン、ステアリン酸M₃、乳糖水和物、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ジェピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



ジェピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22