

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

鼻炎用内服薬

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに

第②類医薬品

# 新スパーク鼻炎カプセルS<sup>®</sup>

新スパーク鼻炎カプセルSは、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎に伴う、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、頭重等の症状をやわらげます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないで下さい

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難

(3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

#### 4. 長期連用しないで下さい



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人は

(4) 高齢者

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人

(7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病

(9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
* 急性汎発性発疹性 膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿泡）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくうつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

➡ 裏面に続く

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【効能効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

### 【用法用量】

次の量を毎食後に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

#### ＜用法用量に関する注意＞

- 用法用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- カプセルの取り出しお

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



### 【成分分量】 6カプセル（成人1日量）中

成 分	分 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をやわらげます。
塩酸プロソイドエフェドリン	120mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血や腫れをおさえ、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.45mg	鼻の粘液の分泌を調整し、鼻みずの過剰な分泌をおさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	45mg	鼻粘膜の腫れや充血をしめ、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	150mg	頭重をやわらげます。

添加物としてセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、青色1号を含有します。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 表示の期限内に服用して下さい。

#### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

#### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

**滋賀県製薬株式会社**

滋賀県甲賀市甲賀町滝879