

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 持続性鼻炎薬

第②類医薬品

くしゃみ・鼻水・鼻づまり

# アスゲン<sup>®</sup>鼻炎カプセルS

アスゲン鼻炎カプセルSは、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎の不快感である、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等に、すみやかに溶けて効果を発揮する粒子と、ゆっくり溶ける粒子を配し、効果が長く続くように製剤された持続性のカプセル剤です。

### ⚠️【使用上の注意】

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難  
(3)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）
- 長期連用しないでください



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)高齢者。  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。  
(7)次の症状のある人。高熱、排尿困難、むくみ  
(8)次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病  
(9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。



## 相談すること (おもてより続く)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください： 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

## 【用法・用量】

下記1回量を1日2回朝夕に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	1日2回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないこと	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。)



## 【成分・分量】


4カプセル(成人1日服用量)中に、次の成分を含有します。

成分	分量	作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8 mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等をおさえます。
塩酸ブソイドエフェドリン	120 mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血・はれを抑制し、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4 mg	分泌抑制作用により、鼻水をおさえ、なみだ目を改善します。
グリチルリチン酸	45 mg	鼻粘膜の炎症をおさえます。
無水カフェイン	100 mg	鼻炎に伴う頭重感をやわらげます。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルクを含有します。またカプセル本体には、赤色102号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話 03-3370-7174 (代表)  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**  
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008