

コールトップ鼻炎液 N

第②類医薬品

(小児用)

コールトップ鼻炎液Nは、鼻炎の症状であるくしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどの不快な症状を効果的に抑える5つの成分を配合した飲みやすい甘いシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります)
4. 長期連用しないで下さい

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき


成分と作用 本品30mL 中

成分	分量	作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	くしゃみ・鼻みず・鼻つまりなどのアレルギー症状をおさえます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	36mg	鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻つまりを緩和します。。
無水カフェイン	50mg	鼻炎にともなう頭重をやわらげ、又眠気をおさえます。
サイシン流エキス	0.2mL (原生薬換算200mg)	抗アレルギー作用により、鼻みず・鼻つまりなどをおさえます。
ショウキョウ流エキス	0.2mL (原生薬換算200mg)	末梢血液循環を促進し、全身を暖め、頭重、鼻つまりなどを改善します。

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na、クエン酸、塩化Na、サッカリンNa、l-メントール、安息香酸Na、パラベン、カラメル、エタノール、バニリン、プロピレングリコール、香料を含有します。

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻つまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)



用法及び用量

次の量を添付の目盛りつきコップ(10mL)ではかり、服用して下さい。


年齢	1回量	用法及び用量
11歳以上15歳未満	10mL	1日3回食後および必要な場合には、就寝前に服用するものとし、また場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には、原則として約4時間の間隔をおいて服用して下さい。
7歳以上11歳未満	7mL	
3歳以上 7歳未満	5mL	
3歳未満	服用しないこと	

<用法及び容量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して、保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) いったん開封後は、品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。



■お問い合わせ先。

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280