



服用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

花粉・ハウスダスト などによる 鼻水・鼻づまりに

ジョイントアルファZ鼻炎カプセル

アレルギー専用内服薬

軽い症状を感じたときからの服用開始が効果的です。

ジョイントアルファZ鼻炎カプセルは、抗アレルギー薬「ケトチフェンフマル酸塩」を配合したアレルギー専用内服薬です。有効成分「ケトチフェンフマル酸塩」は、「抗アレルギー作用」、「抗ヒスタミン作用」、「抗炎症作用」の3つの作用をもち、花粉やハウスダストによるくしゃみ、鼻水、鼻づまりに効果を発揮します。
①抗アレルギー作用:アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑え、アレルギー症状の発生を防ぎます。
②抗ヒスタミン作用:ヒスタミンの受容体をブロックし、起こってしまった症状を鎮めます。
③抗炎症作用:過敏になっている鼻粘膜の炎症を改善します。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) てんかん又はけいれん発作を起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください

（動物試験で乳汁中への移行が認められています。）

5. 服用前後は飲酒しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- (7) 次の症状のある人。 排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|-------|---|
| 皮膚 | 紅斑、発疹、浮腫、かゆみ |
| 鼻 | 鼻血 |
| 精神神経系 | めまい、ふらつき、だるさ、頭痛、味覚異常、しびれ感、神経過敏、イライラ感、頭がボーっとする |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、口内炎 |
| 泌尿器 | 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |
| その他 | 動悸、ほてり、月経異常、体重増加 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------|---|
| 中枢神経症状 | 一過性の意識消失、けいれん、興奮等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢、眠気、不眠

4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(個人差等により薬の効果があらわれるまでに2週間位かかる場合もあります。)

5. 次の場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
症状の改善がみられても服用期間が2週間を超える場合。

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり

【用法・用量】

成人(15才以上) 1回1カプセル、1日2回朝食後及び就寝前に服用してください。

| 年 令 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|-----------|---------|-------------|
| 成人(15才以上) | 1カプセル | 2回、朝食後及び就寝前 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量(必ず1回1カプセル、1日2回)を厳守してください。
- (2) 花粉などによる季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3) カプセルの取り出し方
図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】(1カプセル中)

| 成 分 | 分 量 |
|-------------|---------|
| ケトチフェンフマル酸塩 | 1.38 mg |

添加物としてD-マンニトール、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)