

服用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。



第2類医薬品

鼻のアレルギー症状によるくしゃみ、鼻みず、
鼻づまりは、気分がすぐれないばかりか、睡眠
不足や過労、集中力や注意力の低下など、日常生活も不快にします。

アレキラFX鼻炎錠は、1回1錠、1日2回
服用でフェキソフェナジン塩酸塩が花粉や
ハウスダストなどによるアレルギー症状を緩和
します。また、口の中が渴きにくく、眠くなり
にくいアレルギー専用鼻炎薬です。

アレキラFX鼻炎錠

アレルギー専用鼻炎薬

日本薬局方

フェキソフェナジン塩酸塩錠

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)15才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、制酸剤（水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤）、エリスロマイシン
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(動物試験で乳汁中への移行が認められています)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)アレルギー性鼻炎か、かぜ等他の原因によるものかわからない人。
 - (3)気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
 - (4)鼻づまりの症状が強い人。
 - (5)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (6)高齢者。
 - (7)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	のど・まぶた・口唇等のはれ、発疹、かゆみ、じんましん、皮膚が赤くなる
消 化 器	吐き気、嘔吐、腹痛、消化不良
精神神経系	しびれ感、頭痛、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏、悪夢、睡眠障害
泌 尿 器	頻尿、排尿困難
そ の 他	動悸、味覚異常、浮腫、胸痛、呼吸困難、血圧上昇、月経異常

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
無顆粒球症、 白血球減少、 好中球減少	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、便秘、下痢、眠気

[効能・効果]

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

[用法・用量]

次の量を朝夕に水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1錠	2回（朝・夕）
15才未満	服用しないでください	

（用法・用量に関する注意）

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始める効果的です。
- (3) 継続して服用することで効果が得られます。
- (4) 1週間服用しても症状の改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[錠剤のとり出し方]

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



[成分・分量] 2錠（1日量）中

成 分	分 量
フェキソフェナジン塩酸塩	120mg

添加物：部分アルファー化デンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルナバロウ

[保管及び取扱上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるので防ぐため）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願ひいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6351-2100（代表）受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）

企画元

株式会社 ツルハグループ
マーチャンダイジング

製造販売元

奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号