



鼻炎カプセル

鼻炎用内服薬

特 徴

- アレルギー性鼻炎や急性鼻炎などによる、くしゃみ、鼻水、鼻づまりにすぐれた効果を発揮します。
- 鼻づまりによく効くプソイドエフェドリン塩酸塩をはじめとした4種類の成分がバランスよく働き、鼻炎症状をしずめます。
- 15歳以上1回2カプセル、7～14歳1回1カプセルの服用で、鼻水がとまり、鼻の通りがよくなります。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)授乳中の人
- (4)高齢者
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病
- (9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭痛（頭が重い）

用法・用量

次の量を、4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	2カプセル 	1日3回
7歳～14歳	1カプセル 	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセル剤の取り出し方
図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量（6カプセル）中

成分	含量	はたらき
d-クロロフェニラミン マレイン酸塩	6mg	アレルギー症状をおさえ、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
プソイドエフェドリン 塩酸塩	180mg	鼻粘膜の充血・はれをしずめて、鼻づまりを改善します。
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻水や涙が過剰に出るのをおさえ、鼻づまり、なみだ目を改善します。
無水カフェイン	120mg	頭が重いのをすっきりとさせ、不快な症状を取り去ります。

添加物として、乳糖、セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

製造販売者 協同薬品工業株式会社
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930