

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

急性鼻炎
アレルギー性鼻炎に

ユトラ鼻炎カプセルS

第②類医薬品

鼻炎剤

ユトラ鼻炎カプセルSは、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえる成分を配合したおくすりです。急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などに効果を発揮します。

〔 ⚠ 使用上のご注意 〕

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

(➡裏面に続きます)

症状の名称	症 状
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

□のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）。

			
くしゃみ	鼻みず・鼻づまり	なみだ目	のどの痛み

用法・用量

年 令	1回量	年 令	1回量
15才以上	 2カプセル	11～14才	 1カプセル
		11才未満	服用しないこと

左記1回量を1日3回服用して下さい。ただし、服用間隔は4時間以上おいて下さい。

●用法・用量をお守り下さい。

成分・分量

本品1日量（6カプセル）中

成分名	分量	作 用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりの症状をすばやく改善します。
無水カフェイン	150mg	頭重をやわらげます。
グリチルリチン酸	60mg	抗炎症作用があり、鼻の粘膜の炎症に効果があります。
プソイドエフェドリン塩酸塩	180mg	血管収縮作用により鼻づまりをおさえます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.6mg	副交感神経に作用して、鼻みずの出すぎをおさえます。

添加物として、セルロース、ケイ酸A₂、リン酸水素Ca水和物、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有します。

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **N-ITC 薬品株式会社** 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

お客様相談室：072-331-0417

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 廣 昌 堂** 富山県射水市水戸田2841