


◆ 使用上の注意 

してはいけないこと 

第②類医薬品

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 (かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。) 3. 長期連用しないこと

相談すること 

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。(7) 次の症状がある人。高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人。緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること



成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739
相談窓口 0745-55-0044



外装フィルム

リートン鼻炎カプセルC



医薬品

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

(2) 5~6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 口のかわき、便秘があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 配置期限の過ぎた製品は服用しないこと。

◆ 配置期限

◆ 効能・効果 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

◆ 用法・用量 大人15才以上 1回1カプセル

1日3回 食後白湯又は清水にて服用する。

注意) 用法及び用量を厳守すること。

◆ 成分・分量 1日量(3カプセル)中

ショウキョウ末(生姜)150mg
 カンゾウエキス粉末(原生薬換算量781.25mg) ...100mg
 ベラドンナエキス(原生薬換算量168mg)60mg
 塩酸トリプロリジン6mg
 dl-塩酸メチルエフェドリン90mg
 無水カフェイン150mg
 添加物：カプセル(ゼラチン、ラウリル硫酸塩、亜硫酸水素ナトリウム、黄色三二酸化鉄、着色料・青1)、バレイシヨテンブ、テヒドロ酢酸Na

◆ 51cap入 ¥3,500+^税

副作用被害救済制度
☎0120-149-931