

この説明書は、本剤を服用する前に必ずよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・なみだ目

第②類医薬品

## 新マイゼロン® 鼻炎錠

### 本剤の特徴

鼻炎はかぜのウイルスや花粉やほこりによるアレルギーから生じることが多く、かぜの初期や気候の変わり目におきやすいものです。くしゃみや鼻みず、鼻づまり、頭が重い、なみだが出て止まらない、このような不快な症状に、本品はすぐれた効果をあらわします。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人\*  
(2)次の症状のある人 前立腺肥大による排尿困難  
(3)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 長期連用しないでください。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)授乳中の人  
(4)高齢者  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(6)次の症状のある人 高熱、排尿困難、むくみ  
(7)次の診断を受けた人 緑内障、腎臓病  
(8)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人  
(9)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、けいれん
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
急性汎発性発疹性膿疱症*	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

裏面も必ずお読みください

前面より続く

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 用法及び用量

次の1回量を水又は白湯でかまずに服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	3錠	1日3回 服用間隔は4時間以上おいてください
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

### <用法及び用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法・用量をお守りください。

(3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分及び分量

成 分	分量(9錠中)	作 用
グリチルリチン酸二カリウム	200mg	のどのはれや痛みなどの炎症を抑える効果があります。
塩酸ブソイドエフェドリン	180mg	鼻、のどの粘膜の血管を収縮させ、充血とはれを抑え、鼻づまりに効果をあらわします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのアレルギー症状にすぐれた効果をあらわします。
無水カフェイン	150mg	脳血管に働き不快な頭痛をしずめます。

添加物として、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、タルク、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4) 表示の使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

### 製品についてのお問い合わせ

- ・お買い求めの販売店
- ・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107  
〔受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元  
**ジャパンメディック株式会社**  
富山県富山市横越168