

ご使用に関して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に認めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

ビタハイヤー鼻炎カプセル

ビタハイヤー鼻炎カプセルは鼻みず、鼻づまりを抑え、炎症、頭重を鎮める4種類の成分を配合しています。花粉やハウスダストによるアレルギー性鼻炎、また、季節の変わり目などに起こりがちな不快な鼻炎症状を認め、鼻の通りをよくします。

△【使用上の注意】

してはいけないこと

1. 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。 直立性低血圧による眩暈
- (3) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮痛剤、抗アレルギー薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛剤

3. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしき等の症状があらわれることがあります)

4. 長期服用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮痛剤、抗アレルギー薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、脱え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、眩暈、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のはてり、異常なまぶしき

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の後薄等があらわれる。
高アルドステロン症、 ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つらぼり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再発性鼻出血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、発熱感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、嘔吐等があらわれる。
無動脈球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性炎症性発疹性 膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、尿のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面に続く)

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は細菌性鼻炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

1日3回なるべく空腹時をさけ、4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し方)

成分・分量 3カプセル(成人1日量)中

成 分	分量	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をやわらげます。
塩酸ブソドエドロン	90mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血や腫れをおさえ、鼻づまりを改善します。
ペラジナールアルカロイド	0.42mg	鼻の粘膜の分泌を調整し、鼻みずの過剰な分泌をおさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	45mg	鼻粘膜の腫れや充血をしずめ、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	90mg	頭重をやわらげます。

添加物として乳糖水和物、部分アルファ化デンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料(酸化チタン)、プルランを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 粗の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 一度内袋(アルミの袋)を開封した後は、品質保持の観点から開封日より6ヶ月以内を目安に、なるべくすみやかに使用してください。

本剤について、判がお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(当) 医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhiga/camp/index.html>
電話：0120-140-031(フリーダイヤル)

発売元 協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市竹野一色二丁目番0号

製造販売元 フナキ薬業株式会社
愛知県北港緑区緑町南端005