

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

## 中央グロ鼻炎用カプセル

かぜのひきはじめや、季節のかわりめによくおきる急性鼻炎またはアレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状は不快なものです。

このような症状をそのままにしておくとこじれて余病を併発することも少なくありませんので、早めの手当が大切です。**中央グロ鼻炎用カプセル**はこのような症状を緩和するための有効成分を配合したカプセル剤です。

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと**  (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- 長期連用はしないでください。

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。高熱、排尿困難、むくみ (8) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病、高血圧、腎臓病
- モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	顔のほてり、異常なまぶしさ
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 用法・用量

次の量を服用して下さい。ただし、4時間以上の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 カプセル	3 回
15歳未満	服用しないこと	

（用法及び用量に関連する注意）

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)カプセル剤の取り出し方

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し出して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながります。）

（カプセルの取り出し図）



**成分・分量** 1日量(3カプセル)中、次の成分を含有します。

成 分	含量	はたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6.0mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.45mg	分泌抑制作用により、鼻みずをおさえ、なみだ目を改善します。
塩酸プソイドエフェドリン	90.0mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	60.0mg	鼻炎に伴う頭重感をやわらげます。
グリチルリチン酸	45.0mg	抗炎症作用により、鼻粘膜のはれをおさえ、鼻づまりを改善します。

添加物として、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、カプセル本体にプルラン、酸化チタン、カラギーナン、塩化Kを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元 **大和中央製薬株式会社**  
 奈良県橿原市北八木町1丁目6-16  
 TEL.0744-22-2043

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**  
 富山市水橋北馬場1番7  
 TEL.076-479-9123  
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931