2026年5月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品
鼻炎用内服薬

トピック鼻炎「カプセル」

花粉や家庭などから出る埃によるアレルギー性の鼻炎症状やかぜのひき始め、季節の変わり目などによる鼻炎症状又は副鼻腔炎症状は、とても不快でつらいものです。
トピック鼻炎「カプセル」は、これらの症状である：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）の緩和に優れた効果をあらわす服用し易いカプセル剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1．次の人は服用しないでください
⑴本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
⑵次の症状のある人。
　前立腺肥大による排尿困難
⑶次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
　他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
　（眠気等があらわれることがあります。）

4．過量服用・長期連用しないでください

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
⑴医師の治療を受けている人。
⑵妊婦又は妊娠していると思われる人。
⑶授乳中の人。
⑷高齢者。
⑸薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
⑹かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
⑺次の症状のある人。
　高熱、排尿困難
⑻次の診断を受けた人。
　緑内障、腎臓病
⑼モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、けいれん
泌尿器	排尿困難

裏面も必ずお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気

4.5〜6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回 食後に服用してください。
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満の幼児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉
1. 用法・用量を厳守してください。
2. 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. カプセルの取り出し方
右の図のようにカプセルの入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

(PTPシートの取り出し図)



【成分と作用】

6カプセル(1920mg)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	アレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。
プソイドエフェドリン塩酸塩	180 mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血をおさえます。
グリチリチン (グリチルリチン酸として)	45 mg (24.3〜37.1 mg)	鼻粘膜のアレルギー反応をおさえ、炎症をやわらげます。
無水カフェイン	50 mg	頭重をやわらげます。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、マクロゴール6000、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先
日新薬品工業株式会社　お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
0120-415-688
受付時間　9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931
製造販売元 **日新薬品工業株式会社** 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1