

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



要指導医薬品

持続性点鼻薬

# ナシビン<sup>®</sup> メディ

## ナシビンメディは…

- オキシメタゾリン塩酸塩とクロルフェニラミンマレイン酸塩を初めて配合した持続性点鼻薬です。
- 1日1~2回の使用で、持続した効果を発揮します。
- 配合成分により、鼻づまり、鼻みず、くしゃみに効果をあらわします。
- 一定量の薬液が噴霧できるスプレーです。一度スプレーした液は、容器内に逆流しませんので衛生的です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)モノアミン酸化酵素阻害剤等を服用している人。

※モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する医薬品は以下のようなものがあり、いずれもパーキンソン病の治療に用いられます。また、ジニサミドはてんかんの治療にも用いられます。

- セレギリン塩酸塩 ●ジニサミド ●エンタカポン

#### (3)15歳未満の小児。

#### 2. 本剤を使用している間は、他の鼻炎用点鼻薬を使用しないでください

#### 3. 連続して1週間を超えて使用しないでください (本剤の連用により鼻粘膜障害が発現するおそれがあります)



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感、乾燥感、鼻水、くしゃみ
精神神経系	神経過敏、頭痛、めまい、不眠症
循環器	動悸
消化器	吐き気・嘔吐

#### 3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

### [効能]

鼻づまりのある急性鼻炎又はアレルギー性鼻炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ

## 〔用法・用量〕

下記の1回量を各鼻腔に噴霧してください。なお、適用間隔は、10～12時間以上おいてください。連続して1週間を超えて使用しないでください。使用を中止した場合は2週間以上あけてください。症状が改善したら使用を中止してください。

年齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	各鼻腔に2～3度ずつ	1～2回
15歳未満	使用しないでください。	

## 〔用法・用量に関する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は作用時間が長く、1日1～2回の使用で効果を示します。  
過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3)点鼻用にのみ使用してください。

## 〔使用方法〕

			
使う前にやさしく鼻をかんでください。 (あまりきつくかまないでください。)  （使い始めは、液が噴霧するまで数回、空押ししてください。）	カバーをはずして図のように容器を持ってください。（使い始めは、液が噴霧するまで数回、空押ししてください。）	ノズルの先を軽く鼻腔に垂直に入れ、薬液を噴霧します。もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返してください。	容器を清潔に保つため、使用後は鼻に接する部分を拭いてからカバーをしてください。

## 〔使用にあたっての注意〕

- (1)容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず垂直にしてお使いください。
- (2)ご使用前には鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしておいてください。
- (3)ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどで拭いて、清潔に保ってください。
- (4)容器の先が鼻汁等に触れると、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

## 〔成分・分量と働き〕100mL中

成 分	分 量	働 き
オキシメタゾリン塩酸塩	0.05g	持続性に優れた血管収縮剤で、鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを緩和します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.5g	アレルギーによる鼻づまり、鼻水を楽にします。

添加物として、ベンザルコニウム塩化物、塩化Na、エデト酸Na、リン酸二水素K、pH調節剤を含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にカバーをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
**(独)医薬品医療機器総合機構**  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ下さい。  
**佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口**  
電話 03-5412-7393  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号