

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

鼻炎用点鼻薬

第2類医薬品

アレルギー性鼻炎などの鼻みず・鼻づまりに

ニッドナーベル[®]スプレー

[包装] 15mL

ニッドナーベルスプレーは、鼻粘膜の血管を収縮して充血をとりのぞく成分に加え、アレルギー症状をおさえる成分及び局所の鎮痛・殺菌作用を有する成分を配合しています。また、鼻粘膜に薬剤がよく付着するように工夫した粘性基剤を用いていますので、点鼻後鼻腔からの液ダレが少なく、使用感の優れた点鼻薬です。

! 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

成 分 1mL中

成 分	含 量	作 用
塩酸テトラヒドロゾリン	1mg	鼻粘膜のはれ、充血をおさえ、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます。
リドカイン	3mg	鼻粘膜の痛み、かゆみをしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム	2mg	鼻粘膜の炎症をしずめます。
ベンザルコニウム塩化物	0.1mg	感染を防ぎ鼻腔内を清潔にします。

添加物として、マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、pH調節剤を含有します。

用法・用量

年 齢	用法・用量
成人（15歳以上）及び7歳以上の小児	1回に1～2度ずつ、1日6回を限度として鼻腔内に噴霧します。なお、使用間隔は3時間以上おいてください。
7歳未満	使用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>

- 1.定められた用法・用量をよくお守りください。過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 2.鼻汁をよくかんでから使用してください。
- 3.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 4.点鼻用にのみ使用してください。

ご使用にあたって

- 1.キャップをとり、図のように、容器底部を親指で、容器肩部を人差し指と中指ではさむように持ってください。初回使用時やしばらく間隔をおいてからご使用になるときは、①の矢印の方向に親指で、②から液が噴霧するまで数回空押ししてください。
注)液の出が悪いからといって、噴霧口を針などで突くことはしないでください。故障の原因となります。
- 2.容器の側面が鼻の正面にくるようにして、静かに息を吸い込みながら、スプレーしてください。
- 3.鼻汁がついた場合には、清潔な布などでふいてください。
- 4.スプレー時には、容器を横にしないでください。



保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよく閉めて保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.他の人と共用しないでください。
- 5.使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

京都薬品ヘルスクエア株式会社

〒604-8444

京都市中京区西ノ京月輪町38番地

TEL 075-803-1078

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 **京都薬品ヘルスクエア株式会社**
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **東興薬品工業株式会社**
富山県中新川郡立山町辻20